



2260 Cipolla Rossa di Firenze


giorno medio

Bulbo rosso scuro, medio grosso, a forma di trottola lievemente depressa in alto. Polpa bianca con tuniche interne striate di rosso, soda, molto saporita. Tardiva, si semina da agosto ad ottobre per raccolte anticipate oppure da gennaio a marzo per raccolte estive-autunnali. Serbevole.



2825 Finocchio Mantovano

Ciclo di maturazione precoce con buona resistenza alla prefioritura. Il grumolo, di elevato peso specifico, è compatto, rotondo, bianco; il fogliame, di aspetto molto sano, è di colore verde scuro. Semina: al nord entro metà marzo per raccolto di maggio-giugno; nel ciclo estivo a partire dal 10 giugno per raccolto di settembre-ottobre. Al centro-sud dal 20 giugno per raccolto di ottobre-novembre.



2810 Finocchio Wadenromen

Portamento eretto, medio alto. Il grumolo è di colore bianchissimo, con guaine ben avvolte e a canna piena, del peso di 500-800g. Ciclo medio-tardivo; si semina dal 15 luglio in poi. Il basso contenuto di fibra del grumolo consiglia di mantenere elevato il tenore idrico del terreno, per evitare fenomeni di deformazione del grumolo stesso.



2815 Finocchio Diamante F.1

Ibrido a ciclo di maturazione medio-tardivo. La pianta è molto rustica e di ottimo vigore, tale da consentire al grumolo di ingrossare in condizioni ambientali caratterizzate da basse temperature ed elevata umidità. Il grumolo è rotondo a pasta bianca, privo di fibra e di ottima pezzatura. Buona tenuta alla sovramaturazione. Semina: sconsigliata al nord. Al centro-sud a partire da fine luglio e raccolta da dicembre a febbraio.



2811 Finocchio OR Maggolino

Varietà a bulbo grosso (oltre gli 800g) per semine tardive al centro-sud (ottobre) e raccolte dopo l'inverno fino ad aprile. Molto resistente al freddo ed alla sovra-maturazione.



2840 Finocchio Chiarino (Isport Maf)

Varietà a portamento eretto con fogliame sano e coprente. Il grumolo è tondo, molto bianco, con guaine spesse e presenza minima di fibra. La sezione trasversale mostra la canna piena. Ciclo precoce; peso medio 300-400g. Si può seminare dalla fine di giugno in avanti.